

































CALENDARIO FENOLOGICO DIFESA VITE

| AVVERSITÀ |  "PIANTO" |  GERMOGLIAMENTO |  FOGLIE DISTESE |  GRAPPOLI VISIBILI |  GRAPPOLI SEPARATI |  PRE-FIORITURA |  FIORITURA |  FINE FIORITURA |  ALLEGAGIONE |  ACCRESCIMENTO ACINI |  CHIUSURA GRAPPOLO |  INVAIATURA |  PRE-RACCOLTA | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| PERONOSPORA <i>(Plasmopara viticola)</i> | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |  | | | OPPURE |  | | OPPURE |  | | | | | | | |
| | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| | |  Attività collaterale contro Escoriosi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OIDIO <i>(Uncinula necator)</i> | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| BOTRITE <i>(Botrytis cinerea)</i> | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |  | | |  | |  | | | | |
| | | | | | | | | | Strategia antiperonosporica con attività collaterale contro Botrite | | | | | | | | | |
| Altre avversità |  | | MAL DELL'ESCA | | | TRIPIDI Attività collaterale contro Acari | UVA DA TAVOLA Dicarzol 50 SP | | | | | | | | | | | |
| Efficienza trattamenti | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |

DIFESA VITE: tante soluzioni d'eccellenza per una produzione sostenibile


ELECTIS® TRIO WDG **FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili
Zoxamide 3,6% + Cimoxanil 2,8% + Fosetil Alluminio 35%
INDICAZIONI DI PERICOLO  PERICOLO
Reg. 16104 del 19.05.2015
PERIODO DI CARENZA 28 gg.
CONFEZIONI 1 - 4 - 10 kg
DOSE D'IMPIEGO 4-5 kg/ha


PRESIDIUM® ONE **FORMULAZIONE** Sospensione concentrata
Zoxamide (180 g/l) 16,7% + Dimetomorf (180 g/l) 16,5%
INDICAZIONI DI PERICOLO  ATTENZIONE
Reg. 15907 del 17.02.2016
PERIODO DI CARENZA 28 gg.
CONFEZIONI 1 - 5 L
DOSE D'IMPIEGO 1 L/ha

REBOOT® **FORMULAZIONE** Granuli dispersibili
Zoxamide 33% + Cimoxanil 33%
INDICAZIONI DI PERICOLO  ATTENZIONE
Reg. 15744 del 28.01.2014
PERIODO DI CARENZA 28 gg.
CONFEZIONI 0,5 - 2,5 kg
DOSE D'IMPIEGO 400-450 g/ha

ZOXIUM® 240 SC **FORMULAZIONE** Sospensione concentrata
Zoxamide (240 g/l) 21,8%
INDICAZIONI DI PERICOLO  ATTENZIONE
Reg. 14062 del 10.05.2012
PERIODO DI CARENZA 28 gg.
CONFEZIONI 1 - 5 L
DOSE D'IMPIEGO 0,625-0,75 L/ha

Applicare sempre in miscela con altri fungicidi antiperonosporici

FANTIC® F NC WG **FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili
Benalaxyl-M 3,75% + Folpet 48%
INDICAZIONI DI PERICOLO  PERICOLO
Reg. 13888 del 10.08.2007
PERIODO DI CARENZA 28 gg.
CONFEZIONI 1 - 5 kg
DOSE D'IMPIEGO 2 kg/ha

FANTIC® M NC **FORMULAZIONE** Polvere bagnabile (in sacchetti idrosolubili)
Benalaxyl-M 4% + Mancozeb 65%
INDICAZIONI DI PERICOLO  ATTENZIONE
Reg. 13542 del 14.02.2007
PERIODO DI CARENZA 42 gg.
CONFEZIONI 1 - 5 kg
DOSE D'IMPIEGO 2,5 kg/ha

AIRONE® PIÙ **FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili
Rame metallo 28% (ossicloruro 14% + idrossido 14%)
INDICAZIONI DI PERICOLO  ATTENZIONE
Reg. 12737 del 31.07.2009
PERIODO DI CARENZA 20 gg.
CONFEZIONI 1 - 10 kg
DOSE D'IMPIEGO 1,7-2,7 kg/ha

AIRONE® EXTRA **FORMULAZIONE** Granuli idrodispersibili
Rame metallo 30% (ossicloruro 10% + idrossido 20%)
INDICAZIONI DI PERICOLO  PERICOLO
Reg. 7911 del 23.04.1990
PERIODO DI CARENZA 21 gg.
CONFEZIONI 1 - 10 kg
DOSE D'IMPIEGO 1-1,5 kg/ha

DOMARK® 125 **FORMULAZIONE** Micro-emulsione olio-acqua
Tetraconazolo (125 g/l) 11,6%
INDICAZIONI DI PERICOLO 
Reg. 13065 del 12.10.2009
PERIODO DI CARENZA 30 gg.
CONFEZIONI 0,25 - 1 L
DOSE D'IMPIEGO 240 ml/ha

POLYVERSUM® **FORMULAZIONE** Polvere bagnabile
Pythium oligandrum (ceppo M1) - min. 1x10⁶ UFC/g
INDICAZIONI DI PERICOLO nessun pittogramma
Reg. 16654 del 21.07.2017
PERIODO DI CARENZA 0 gg.
CONFEZIONI 0,1 - 0,5 kg
DOSE D'IMPIEGO 200-300 g/ha

IBISCO® **FORMULAZIONE** Liquida
COS-OGA (12,5 g/l) 1,25%
INDICAZIONI DI PERICOLO  ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA
Reg. 16509 del 05.02.2016
PERIODO DI CARENZA 0 gg.
CONFEZIONI 1 - 5 L
DOSE D'IMPIEGO 2-3 L/ha

REMEDIER® **FORMULAZIONE** Polvere bagnabile
Trichoderma asperellum 2% + T. gamsii 2% - min. 3x10⁷ UFC/g
INDICAZIONI DI PERICOLO nessun pittogramma
Reg. 13158 del 07.03.2006
PERIODO DI CARENZA 3 gg.
CONFEZIONI 1 kg
DOSE D'IMPIEGO 250 g/hl (min. 1 kg/ha)

DICARZOL® 50 SP **FORMULAZIONE** Polvere in sacchetti idrosolubili
Formetanate 50%
INDICAZIONI DI PERICOLO  PERICOLO
Reg. 14972 del 14.02.2012
PERIODO DI CARENZA inizio fioritura
CONFEZIONI 1 kg (4 s.i. x 0,250 kg)
DOSE D'IMPIEGO 1 kg/ha (125 g/ha) -Uva da Tavola-

| PRODOTTO | COMPOSIZIONE | FORMULAZIONE | INDICAZIONI PERICOLO | REGISTRAZIONE | PERIODO CARENZA | CONFEZIONI | DOSE |
|------------------------|--|--------------|--|----------------------|---------------------|----------------|--------------|
| AIRONE® LIQUIDO | Rame metallo (272 g/l) 20% (ossicloruro 10% + idrossido 10%) | SC |  ATTENZIONE | 15251 del 14.12.2011 | 20 gg. | 1 - 10 L | 2-4 L/ha |
| ALETIL® DF | Fosetil Alluminio 80% | WDG | nessun pittogramma | 17368 del 30.01.2019 | 28 gg. vite da vino | 1 - 5 kg | 250-300 g/ha |
| BREZZA® | Pyrimethanil (400 g/l) 36,7% | SC |  | 15037 del 10.02.2011 | 21 gg. | 1 - 5 L | 2-2,5 L/ha |
| ELECTIS® R FLOW | Zoxamide (40 g/l) 2,85% + Rame (solfato tribasico) (266 g/l) 19,1% | SC |  ATTENZIONE | 15419 del 14.06.2012 | 28 gg. | 1 - 10 L | 3 L/ha |
| IMPERO® 18 EC | Abamectina (18 g/l) 1,9% | EC |  PERICOLO | 17295 del 18.09.2018 | 10 gg. | 1 - 5 L | 0,5-1 L/ha |
| MAGO® | Sorbitan mono oleato etossilato (120 g/l) 12% | L |  ATTENZIONE | 17360 del 18.12.2018 | - | 1-5-20 L | 50-150 ml/ha |
| NABUCCO® | Metrafenone (500 g/l) 42,37% | SC |  | 17317 del 22.10.2018 | 28 gg. | 0,25 - 1 L | 0,25 L/ha |
| TIOFLOR WDG | Zolfo 80% | WDG |  ATTENZIONE | 11619 del 05.03.2003 | 5 gg. | 1 - 10 - 25 kg | 3-4 kg/ha |

Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.



Apri il QRcode e leggi l'approfondimento sulla gamma completa "Difesa Vite"

GOWAN ITALIA S.r.l. · Tel. 0546 629911
gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

Gowan
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura